

経鼻インフルエンザ生ワクチン（フルミスト）の 接種を希望される方へ

フルミストについての大切な説明文書です。必ずお読みください！

フルミストとは？

- ・フルミストは、鼻の中へ吹き付けるインフルエンザ予防のための弱毒化生ワクチンです。従来のインフルエンザの不活化ワクチンの注射と違い、鼻腔内にスプレーを吹きかけるだけなので痛みがありません。
- ・フルミストは生きたウイルスで免疫を作るため、流行しているインフルエンザと株が違っていても重症化を予防する効果があると考えられています。
- ・効果は1シーズンですが、従来の注射型のインフルエンザワクチンよりも効果が長く持続します。
- ・フルミストには、インフルエンザA型2種類、B型2種類の計4種類の株が入っています。
- ・インフルエンザウイルスは主に気道粘膜に感染しますが、鼻腔に直接免疫をつけるフルミストは、従来の注射でのワクチンによって誘導されるIgG抗体だけでなく、気道分泌型のIgA抗体も得られるため、（特に小児において）予防効果が高いと考えられています。ただし人種や地域により効果は様々であり、接種しても必ず感染を予防するものではありません。

当院で使用するワクチンについて

薬剤名：フルミスト（FluMist）

製造元：MedImmune

販売元：アストラゼネカ カナダ

*2003年にアメリカ食品医薬品衛生局に認可されたワクチンで、**15年以上の安全な実績**があります。

*2011年からヨーロッパでも認可され発売されています。

接種対象者

2歳以上49歳以下の健康な方

（激しく泣いてしまうお子さまは多量の鼻汁により効果が低下するため、接種できない場合があります）

接種できない方

- ・5歳未満で今までに喘息があった方、1年以内に喘息の発作があった方
- ・免疫不全の方、また免疫不全の方と接触する機会のある方
- ・妊婦または妊娠の可能性のある方
- ・アスピリン内服中の方
- ・重度の卵アレルギー（アナフィラキシーの既往）をおもちの方
- ・37.5℃以上の熱がある方

接種料金と接種回数

1回 9,000円 (税込)

1回接種

*ただし9歳未満でインフルエンザワクチンを接種したことのない方、またはインフルエンザに罹患したことのない方は4週以上の間隔をあけて2回。

副反応について

接種後、30～40%の方に鼻水がでることがあります。

その他、咽頭痛や咳などの軽い風邪のような症状が出ることがあります。

また頻度はまれですが、発疹・じんましんのほか、アナフィラキシーショックやギランバレー症候群のような重い反応を起こす可能性は、他のワクチンと同様に否定できません。

予防接種による健康被害救済について

公的な補償制度は適応されません。

フルミストの接種による健康被害が起こった場合、国内未承認のため「予防接種健康被害救済制度」による補償や、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく給付は受けられません。

同時接種について

フルミストは国内未承認ワクチンで公的な補償制度がないため、他のワクチンとの同時接種で万が一予防接種被害が生じた場合、他のワクチンが原因であっても「予防接種健康被害救済制度」も受けられなくなる可能性があるため、同時接種をおこないません。

接種当日・接種後の注意について

- ・この説明文書をよくお読みになり、本人または保護者の方が、**十分ご理解・納得された上で**問診票(同意書)にサインをし、ご提出ください。
- ・接種の前にご不明な点などがあれば直接医師へお問い合わせください。
- ・接種後30分ほどは、すぐにクリニックに戻れる場所にいていただき、副反応などがいないか十分観察してください。
- ・接種当日の入浴は可能です。
- ・フルミストは生ワクチンですので、女性の方は1か月間ほど妊娠をお控えください。